



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 123 700
A1

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: 83104094.4

⑤① Int. Cl.³: **C 07 D 213/79, C 07 D 213/81,**
A 61 K 31/44

⑳ Anmeldetag: 27.04.83

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 07.11.84
Patentblatt 84/45


⑦① Anmelder: **Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, D-7750 Konstanz (DE)**

②④ Benannte Vertragsstaaten: **AT BE FR GB IT LU NL SE**

⑦② Erfinder: **Amschler, Hermann, Dr., Hohenhewenstrasse 19, D-7760 Radolfzell (DE)**
Erfinder: **Sanders, Karl, Dr., Hinterhauser Strasse 2, D-7760 Konstanz (DE)**
Erfinder: **Ulrich, Wolf-Rüdiger, Dr., Brandesstrasse 14, D-7750 Konstanz (DE)**

⑤④ Substituierte Picolinsäuren, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung und sie enthaltende Arzneimittel.

⑤⑦ Substituierte Picolinsäuren der allgemeinen Formel I



(I),

deuten, R⁴ Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Benzyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen und X O (Sauerstoff) oder NH bedeutet, sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen, wobei R¹, R² und R³ nicht gleichzeitig Alkyl bedeuten, wenn X O (Sauerstoff) und A Ethylen darstellt, sind neue Verbindungen mit blutdrucksenkender Wirksamkeit. Verfahren zur Herstellung dieser Verbindungen werden angegeben.

EP 0 123 700 A1

worin R¹ Alkyl mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen – jedoch nicht Butyl, wenn R² und R³ die Bedeutung Alkyl haben und X NH bedeutet –, Cycloalkylalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R² Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, R³ Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, oder R² und R³ gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Morpholino, Piperidino, Hexahydroazepino oder in 4-Position durch R⁴ substituiertes 1-Piperazinyli be-

Substituierte Picolinsäuren, Verfahren zu ihrer Herstellung,
ihre Verwendung und sie enthaltende Arzneimittel

Anwendungsgebiet der Erfindung

- 5 Die Erfindung betrifft substituierte Picolinsäuren, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung und sie enthaltende Arzneimittel.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen werden in der pharmazeutischen Industrie als Zwischenprodukte und zur Herstellung von Medikamenten verwendet.

Bekannter technischer Hintergrund

- In der Deutschen Offenlegungsschrift DE-OS 23 06 671 werden di- und trisubstituierte Picolinsäure- und Thio-picolinsäurederivate als
- 15 Dopamin- β -Hydroxylasehemmer mit antihypertensiver Wirkung beschrieben.- In den US-Patenten USP 4,044,140 und USP 4,127,662 werden Triphenyl-methyl-substituierte Picolinsäurederivate beschrieben, die als Anti-Aknemittel Verwendung finden sollen. - Die Japanische Offenlegungsschrift 50 - 130 770 offenbart (Halogen)butyl-substituierte Picolinsäureamide,
- 20 die eine hypotensive Wirkung besitzen sollen. - In der sowjetischen Patentschrift SU 598 892 wird ein n-Butyl-picolinsäureamid beschrieben, das als Antiarrhythmicum eingesetzt werden soll. - Im britischen Patent GB 1,037,380 werden Pyridincarbonsäurederivate beansprucht, die in pharmazeutischen Produkten Verwendung finden sollen.

25


- Es wurde nun eine Klasse neuer substituierten Picolinsäuren synthetisiert, die weder in den erwähnten Publikationen genannt noch durch sie nahegelegt werden. Ferner wurde gefunden, daß diese substituierten Picolinsäuren interessante, besonders vorteilhafte pharmakologische Eigenschaften aufweisen.

30

Beschreibung der Erfindung

Gegenstand der Erfindung sind substituierte Picolinsäuren der allgemeinen Formel I,

35



- 5
- 10 worin
- 15 R^1 Alkyl mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen - jedoch nicht Butyl, wenn R^2 und R^3 die Bedeutung Alkyl haben und X NH bedeutet -, Cycloalkylalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- 20 R^2 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- R^3 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, oder
- R^2 und R^3 gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Morpholino, Piperidino, Hexahydroazepino oder in 4-Position durch R^4 substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,
- 25 R^4 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Benzyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen und
- 30 X O (Sauerstoff) oder NH bedeutet,
- sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen, wobei R^1 , R^2 und R^3 nicht gleichzeitig Alkyl bedeuten, wenn X O (Sauerstoff) und A Ethylen darstellt.

Alkylreste können geradkettig (z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl) oder verzweigt (z.B. Isopropyl, Isobutyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, Neopentyl, 3-Methylbutyl oder 3,3-Dimethylbutyl) sein.

Cycloalkylreste der Cycloalkylalkylgruppen sind der Cyclopropyl-, Cyclobutyl-, Cycloheptyl- und insbesondere der Cyclopentyl- und Cyclohexylrest. Alkylenreste der Cycloalkylalkylgruppen sind der Tetramethylen-, Trimethylen-, Ethylen- und insbesondere der Methylenrest. Ein bevorzugter Cycloalkylalkylrest ist der Cyclohexylmethylrest.

Halogenatome im Sinne der Erfindung sind das Fluor-, Chlor- und Bromatom.

Alkoxygruppen sind beispielsweise die Butoxy-, Propoxy- und insbesondere die Ethoxy- und die Methoxygruppe.

Als Alkenylreste seien beispielsweise der Allyl-, der 2-Methylallyl- und der 1-Butenylrest genannt.

Als Alkylengruppen seien beispielsweise die Methylen-, Ethylmethylen-, Propylen-, Tetramethylen- und Pentamethylen-, insbesondere die Trimethylen- und Ethylengruppe genannt.


Als Salze kommen alle Säureadditionssalze in Betracht. Besonders erwähnt seien die pharmakologisch verträglichen Salze der in der Galenik üblicherweise verwendeten anorganischen und organischen Säuren. Pharmakologisch unverträgliche Salze, die beispielsweise bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen im industriellen Maßstab als Verfahrensprodukte zunächst anfallen können, werden durch dem Fachmann bekannte Verfahren in pharmakologisch verträgliche Salze übergeführt. Als solche eignen sich beispielsweise in Wasser leicht oder auch schwer lösliche Säureadditionssalze, wie das Hydrochlorid, Hydrobromid, Hydroiodid, Phosphat, Nitrat, Sulfat, Acetat, Citrat, Gluconat, Benzoat, Hibenat (2-(4-Hydroxybenzoyl)-benzoat), Propionat, Butyrat, Sulfosalicylat, Maleat, Laurat, Malat, Fumarat, Succinat, Oxalat, Tartrat, Amsonat (4,4'-Diamino-stilben-2,2'-disulfonat), Embonat (1,1'-Methylen-bis-2-hydroxy-3-naphthoat), Metembonat, Stearat, Tosilat (p-Toluolsulfonat), 2-Hydroxy-3-naphthoat, 3-Hydroxy-2-naphthoat, Mesilat (Methansulfonat), ferner Salze mit Bumetanid (3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl-benzoesäure), Furosemid (4-Chlor-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranyl-säure), Azosemid [2-Chlor-5-(1H-tetrazol-5-yl)-N¹-2-thenylsulfamylamid], Galosemid [N-[4-(3-Trifluormethyl-

anilino)-3-pyridylsulfonyl]-propionamid], Besunid (4-Benzyl-3-(butylamino)-5-sulfamoyl-benzoesäure), Piretanid (4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoyl-benzoesäure), Etacrynsäure ([2,3-Dichlor-4-(2-methylenbutyryl)-phenoxy]-essigsäure), Tienilinsäure ([2,3-Dichlor-4-(2-thenoyl)-phenoxy]-essigsäure), 4-Chlor-3-sulfamoyl-benzoesäure.

Eine Ausgestaltung (Ausgestaltung a) der Erfindung sind Verbindungen der allgemeinen Formel I, worin R^1 Alkyl mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen -jedoch nicht Butyl, wenn R^2 und R^3 die Bedeutung Alkyl haben und X NH darstellt- bedeutet, R^2 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, R^3 eine der Bedeutungen von R^2 hat oder R^2 und R^3 gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Morpholino, Piperidino, Hexahydroazepino oder in 4-Position durch R^4 substituiertes 1-PiperazinyI bedeuten, R^4 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Benzyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen und X O(Sauerstoff) oder NH bedeutet, sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen, wobei R^2 und R^3 nicht gleichzeitig Alkyl bedeuten, wenn X O(Sauerstoff) und A Ethylen darstellt.

Eine weitere Ausgestaltung (Ausgestaltung b) der Erfindung sind Verbindungen der allgemeinen Formel I, worin R^1 Cycloalkylalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R^2 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, R^3 eine der Bedeutungen von R^2 hat, A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen und X O(Sauerstoff) oder NH bedeutet, sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

- Eine weitere Ausgestaltung (Ausgestaltung c) der Erfindung sind Verbindungen der allgemeinen Formel I, worin R^1 Cycloalkylalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe
- 5 Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, R^2 und R^3 gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Morpholino, Piperidino, Hexahydroazepino oder in 4-Position durch R^4 substituiertes 1-Piperaziny] bedeuten, R^4 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl,
- 10 Benzyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen und X O (Sauerstoff) oder NH bedeutet, sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.
- 15 Bevorzugte Verbindungen der Ausgestaltung a sind solche der allgemeinen Formel I*



- worin
- 30 R^{1*} Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen (jedoch nicht Butyl, wenn R^{2*} und R^{3*} die Bedeutung Methyl oder Ethyl haben und X NH darstellt) bedeutet,
- R^{2*} Methyl oder Ethyl bedeutet,
- R^{3*} Methyl oder Ethyl bedeutet oder
- 35

R^{2*} und R^{3*} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4*} substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,

R^{4*} Phenyl oder durch Methoxy oder Ethoxy substituiertes Phenyl bedeutet,


A^* Ethylen oder Trimethylen und

5 X^* O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen, wobei R^{2*} und R^{3*} nicht Methyl oder Ethyl bedeuten, wenn X^* O(Sauerstoff) und A^* Ethylen darstellt.

Bevorzugte Verbindungen der Ausgestaltung b sind solche der allgemeinen

10 Formel I**



(I**),

15

20

worin

R^{1**} Cycloalkylalkyl mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 oder 2 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu zwei Substituenten aus der Gruppe Chlor, Methoxy oder Ethoxy bedeutet,

25

R^{2**} Methyl oder Ethyl bedeutet,

R^{3**} Methyl oder Ethyl bedeutet,

A^{**} Ethylen oder Trimethylen und

X^{**} O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

30 sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

35

Bevorzugte Verbindungen I** sind solche, in denen A** Trimethylen und X** NH bedeutet und R^{1**}, R^{2**} und R^{3**} die oben angegebenen Bedeutungen haben, sowie die pharmakologisch verträglichen Säureadditionssalze dieser Verbindungen.


5

Besonders bevorzugte Verbindungen I** sind solche, in denen R^{1**} Cyclohexylmethyl, Phenyl oder 4-Chlorphenyl bedeutet, R^{2**} und R^{3**} Methyl oder Ethyl bedeuten, A** Trimethylen und X** NH darstellt, sowie die pharmakologisch verträglichen Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

10

Bevorzugte Verbindungen der Ausgestaltung c sind solche der allgemeinen Formel I***

15



20

worin

R^{1***} Cycloalkylalkyl mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 oder 2 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu zwei Substituenten aus der Gruppe Chlor, Methoxy oder Ethoxy bedeutet,

25

R^{2***} und R^{3***} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4***} substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,

30

R^{4***} Wasserstoff, Methyl, Phenyl oder durch Methoxy oder Ethoxy substituiertes Phenyl bedeutet,

A*** Ethylen oder Trimethylen und

X*** O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

35

Bevorzugte Verbindungen I^{***} sind solche, in denen A^{***} Trimethylen und X^{***} NH bedeutet und R^{1***}, R^{2***}, R^{3***} und R^{4***} die oben angegebenen Bedeutungen haben, sowie die pharmakologisch verträglichen Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

5

Besonders bevorzugte Verbindungen I^{***} sind solche, in denen R^{1***} Cyclohexylmethyl, Phenyl oder 4-Chlorphenyl bedeutet, R^{2***} und R^{3***} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4***} substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten, R^{4***} 2-Methoxy- oder 2-Ethoxy-substituiertes Phenyl bedeutet, A^{***} Trimethylen und X^{***} NH darstellt, sowie die pharmakologisch verträglichen Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

10

Die Ausgestaltungen b und c sind gegenüber der Ausgestaltung a bevorzugt.

15


Als Vertreter der erfindungsgemäßen Verbindungen seien beispielsweise genannt:

- 5-n-Propylpyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)ester
- 20 5-Ethylpyridin-2-carbonsäure-(5-dimethylaminopentyl)amid
- 5-n-Hexylpyridin-2-carbonsäure-(2-diethylaminoethyl)amid
- 5-Isopropylpyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminobutyl)amid
- 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(3-piperidinopropyl)amid
- 5-n-Hexylpyridin-2-carbonsäure-(2-pyrrolidinoethyl)amid
- 25 5-Ethylpyridin-2-carbonsäure-(5-morpholinopentyl)ester
- 5-Methylpyridin-2-carbonsäure-(2-piperidinobutyl)amid
- 5-Cyclopentylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)ester
- 5-(2-Cyclohexylethyl)-pyridin-2-carbonsäure-(4-dimethylaminobutyl)amid
- 5-Cycloheptylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)amid
- 30 5-(3-Cyclobutylpropyl)-pyridin-2-carbonsäure-(2-diisopropylaminoethyl)ester
- 5-Cyclopropylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-pyrrolidinopropyl)amid
- 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methylphenyl)piperazinyl-1-]-propyl)amid
- 5-(2-Cyclopentylethyl)-pyridin-2-carbonsäure-[3-(4-phenylpiperazinyl-1)-propyl]amid
- 35 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazinyl-1]-butyl)amid

- 5-(3-Cyclobutylpropyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)amid
 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(4-diethylaminobutyl)amid
 5-(2,4-Dichlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)amid
 5-(4-Hydroxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(4-diisopropylaminobutyl)ester
 5 5-(4-Ethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(2-diethylaminopropyl)amid
 5-(2,4-Dichlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)amid
 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-[3-(4-methylpiperaziny1-1)-propyl]-amid
 10 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(4-[4-(2-methoxyphenyl)piperaziny1-1]-butyl)-amid
 5-(4-Hydroxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methylphenyl)piperaziny1-1]-propyl)amid
 5-(2,4,6-Trichlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)amid,
 15 insbesondere
 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)-amid
 20 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-amid
 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)-amid
 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)-amid
 25 sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

Wenn in der nachfolgenden Beschreibung von den Verbindungen "der (allgemeinen) Formel I" gesprochen wird, so umfaßt dieser Ausdruck (bzw. er steht stellvertretend für) die Verbindungen der Ausgestaltungen a, b und c, die
 30 Verbindungen I*, I** und I***, ihre bevorzugten und besonders bevorzugten Vertreter sowie die expressis verbis genannten Verbindungen; darüberhinaus umfaßt dieser Ausdruck die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von substituierten Picolinsäuren der allgemeinen Formel I, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man Picolinsäurederivate der allgemeinen Formel II



mit Aminen der allgemeinen Formel III



umsetzt und gewünschtenfalls anschließend in die Säureadditionssalze überführt, wobei die Reste Y und Z so zu wählen sind, daß das gewünschte Glied X gebildet wird, und wobei R^1 , R^2 , R^3 , A und X die oben angegebenen Bedeutungen haben.

20 Welche Reste Y und Z gewählt werden müssen, ist dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens geläufig. Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über geeignete Reste Y und Z bei gewünschtem X:

X = O (Sauerstoff)

- 25 a) Y = OH, Z = OH (Veresterung)
 b) Y = Halogen, Z = OH
 c) Y = OR' (R' ist z.B. Methyl, Ethyl), Z = OH (Umesterung)
 d) Y = O[⊖] (Salz eines Picolinsäurederivates), Z = Abgangsgruppe (z.B. Halogen, wie Brom oder Chlor) (Alkylierung)

X = NH

- e) Y = OH, Z = NH₂
 f) Y = Halogen, Z = NH₂
 g) Y = OR' (R' ist z.B. Methyl, Ethyl), Z = NH₂
 35 h) Y = -O-CO-OR' (R' ist z.B. Methyl, Ethyl), Z = NH₂

Die Umsetzung nach a) wird analog zu üblichen Veresterungsreaktionen durchgeführt, vorzugsweise in einem wasserfreien Lösungsmittel (z.B. Dichlorethan, Toluol, Benzol, Dioxan), unter saurer Katalyse (Mineralsäure, saurer Ionenaustauscher), bei Temperaturen zwischen 50 und 150°C, vorteilhafterweise bei der Siedetemperatur des verwendeten Lösungsmittels, und unter Verwendung eines Wasserabscheiders oder eines wasserbindenden Molekularsiebes.

Die Umsetzung nach b) wird zweckmäßigerweise in einem inerten, wasserfreien Lösungsmittel durchgeführt (z.B. Acetonitril, Dichlorethan, Tetrahydrofuran, Benzol), wobei als Säurehalogenid bevorzugt ein Säurebromid oder -chlorid verwendet wird. Je nach Reaktivität des eingesetzten Alkohols erfolgt die Umsetzung unter gleichzeitiger Kühlung oder unter leichtem Erwärmen, bevorzugt jedoch bei Raumtemperatur. Die Reaktion wird unter Zusatz eines säurebindenden Mittels (z.B. eines Amins, wie Triethylamin) oder mit einem Überschuß an Verbindung III durchgeführt.

Die Umesterungsreaktion nach c) erfolgt vorzugsweise unter Basenkatalyse, z.B. durch Zusatz katalytischer Mengen an Natrium, in inerten, hochsiedenden Lösungsmitteln (z.B. Xylol) oder auch ohne Lösungsmittel, bei Temperaturen zwischen 50 und 180°C.

Die Alkylierungsreaktion nach d) wird entweder als Einphasenreaktion (direkte Umsetzung des Picolinsäuresalzes mit dem Alkylierungsmittel) oder als Zweiphasenreaktion unter Zusatz eines Phasentransferkatalysators (Einsatz der freien Säure und einer geeigneten Base) vorgenommen.

Die Amidbildungsreaktion nach e) erfolgt durch Erhitzen (vorzugsweise auf 50 bis 100°C) der entsprechenden Säure und des Amins in inerten, wasserfreien Lösungsmitteln (wie z.B. Tetrahydrofuran, Dioxan, Toluol), vorteilhafterweise in Gegenwart eines wasserbindenden Mittels (z.B. eines Carbodiimids).

Die Umsetzung nach f) kann analog der unter b) beschriebenen Reaktion durchgeführt werden. Die Umsetzung nach g) erfolgt vorteilhafterweise wie bei c) beschrieben ohne Zusatz eines Lösungsmittels bei erhöhter Temperatur, gegebenenfalls unter Basenkatalyse.

5

Die Umsetzung mit dem gemischten Anhydrid nach h) erfolgt vorzugsweise in wasserfreien Lösungsmitteln (z.B. in Dichlormethan, Chloroform, Dioxan) bei Temperaturen zwischen 0° und 50°C, bevorzugt bei Raumtemperatur. Statt eines gemischten Anhydrides kann natürlich auch
10 das reine Anhydrid der entsprechenden Picolinsäure verwendet werden.

Säureadditionssalze erhält man durch Auflösen der freien Base in einem geeigneten Lösungsmittel, z.B. in einem chlorierten Kohlenwasserstoff, wie Methylenchlorid oder Chloroform, oder einem niedermolekularen aliphatischen Alkohol (Ethanol, Isopropanol), das die gewünschte Säure
15 enthält, oder dem die gewünschte Säure anschließend zugegeben wird.

Die Salze werden durch Filtrieren, Umfällen, Ausfällen mit einem Nichtlösungsmittel für das Anlagerungssalz oder durch Verdampfen des
20 Lösungsmittels gewonnen.

Erhaltene Salze können durch Alkalisierung, z.B. mit wäbrigem Natriumhydrogencarbonat, in die freien Basen umgewandelt werden, welche wiederum in Säureadditionssalze übergeführt werden können. Auf diese Weise
25 lassen sich pharmakologisch nicht verträgliche Säureadditionssalze in pharmakologisch verträgliche Säureadditionssalze umwandeln.

Die Ausgangsverbindungen II und III sind entweder bekannt oder sie können nach bekannten Verfahren hergestellt werden.

30

Zur Herstellung der Verbindungen der Ausgestaltungen a, b und c bzw. ihrer bevorzugten Vertreter I*, I** und I*** geht man von Verbindungen II, II*, II** bzw. II*** und III, III*, III** bzw. III*** aus, in denen die Substituenten und Symbole R¹, R², R³ und A, R^{1*}, R^{2*}, R^{3*} und A*,
35

R^{1**} , R^{2**} , R^{3**} und A^{**} bzw. R^{1***} , R^{2***} , R^{3***} und A^{***} die oben angegebenen Bedeutungen haben, wobei die Glieder X , X^* , X^{**} bzw. X^{***} durch geeignete Reste Y bzw. Z , die die oben angegebenen Bedeutungen haben, gebildet werden.

5

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher ohne sie einzuschränken. Schmp. steht für "Schmelzpunkt", Sdp. für "Siedepunkt".

10

15

20

25

30

35

Beispiele zur Ausführung der Erfindung

1. 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(2-diethylaminoethyl)ester
- a) 5 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure werden unter Außenkühlung mit
20 ml Thionylchlorid übergossen und über Nacht stehengelassen. Die
Suspension wird im Vakuum eingedampft, der dunkle Rückstand in
50 ml Acetonitril aufgenommen und zu einer Lösung von 9 g 2-Di-
ethylaminoethanol in 20 ml Acetonitril getropft. Die Mischung wird
6 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und anschließend im Vakuum ein-
gedampft. Der halbfeste Rückstand wird in 100 ml 2 n Salzsäure auf-
genommen und 3 mal mit je 100 ml Chloroform extrahiert. Die wäßrige
Phase wird anschließend mit 2 n Natronlauge auf pH 9 gestellt und
das sich abscheidende Öl 3 mal mit je 100 ml Chloroform extrahiert.
Die vereinigten Chloroformphasen werden über geglühtem Kaliumcarbo-
nat getrocknet und im Vakuum eingedampft. Das zurückbleibende brau-
ne Öl wird einer Kugelrohrdestillation unterworfen. Die Titelver-
bindung destilliert bei 150°C/0,015 mmHg (2 Pa) als leicht gelb-
liches Öl.
Ausbeute 3,8 g (53 %).
- b) 5,0 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäuremethylester werden mit 9,1 g
2-Diethylaminoethanol und 100 mg Natrium im Ölbad 2 Stunden auf
130°C erhitzt. Anschließend wird die Mischung im Vakuum eingedampft
und wie unter a) beschrieben weiterbehandelt. Nach Destillation er-
hält man 4,0 g (56 %) der Titelverbindung.
- c) 5,0 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure werden mit 4,4 g 2-Diethyl-
aminoethanol-hydrochlorid und 1 g p-Toluolsulfonsäure in 50 ml 1,2-
Dichlorethan in einem Rundkolben mit Thielepape-Aufsatz 12 Stunden
am Rückfluß erhitzt. Das sich im Aufsatz befindende Molekularsieb
entfernt das anfallende Wasser. Nach beendeter Reaktion wird der
Kolbeninhalt abgekühlt, mit 2 n Salzsäure versetzt und die Dichlor-
ethanphase abgezogen. Die salzsaure, wäßrige Lösung wird wie unter a)
beschrieben aufgearbeitet. Man erhält 3,2 g (44 %) der Titelverbin-
dung.
2. 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)-ester
- 5,0 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure werden mit 8,8 g Tetrabutylammo-
niumhydrogensulfat und 5 g 3-Dimethylaminopropylchlorid-hydrochlorid
in einer Mischung von 100 ml 2n Natronlauge und 100 ml Dichlormethan

8 Stunden kräftig bei 30°C gerührt. Anschließend wird die Dichlormethanphase abgetrennt, über Kaliumcarbonat getrocknet und im Vakuum eingedampft. Das zurückbleibende bräunliche Öl wird im Kugelrohr destilliert, wobei die Titelverbindung bei 150°C/0,01 mmHg (1,33 Pa) als leicht gelbliches Öl in einer Ausbeute von 2,0 g (29 %) gewonnen wird.

3. 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-ester

- 10 1,3 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 1,7 g 1-(3-Hydroxypropyl)-4-(2-methoxyphenyl)-piperazin werden bei 140°C unter Zusatz von 100 mg Natrium 16 Stunden gerührt, wobei Methanol langsam abdestilliert wird. Die schwarzbraune Masse wird zur Reinigung an neutralem Kieselgel mit Chloroform/Methanol 98:2 chromatographiert.
- 15 Man erhält nach Eindampfen der entsprechenden Fraktionen 0,8 g (27 %) der Titelverbindung als hellbraunes Öl.

4. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(2-dimethylaminoethyl)ester

- 5,0 g 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester werden mit 10 ml 2-Dimethylaminoethanol und ca. 100 mg Natrium 3 Stunden auf 50°C und
- 20 weitere 2 Stunden auf 100°C erhitzt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch im Vakuum eingedampft und der dunkelbraune Rückstand wie im Beispiel 3 beschrieben chromatographiert. Man erhält 0,8 g der Titelverbindung als helles, gelblich braunes Öl.

25

5. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-ester

- Aus 5,0 g 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 9,3 g 3-Diethylaminopropanol erhält man nach der im Beispiel 1 b beschriebenen Arbeitsweise nach Kugelrohrdestillation bei 200°C/0,15 mmHg (20 Pa)
- 30 2,4 g (33 %) der Titelverbindung als bräunliches Öl.

6. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(2-[4-phenylpiperazinyl-1]ethyl)-ester

- Aus 5,0 g 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 13,8 g 1-(2-Hydroxyethyl)-4-phenylpiperazin in 25 ml Xylol erhält man nach der in
- 35 Beispiel 3 beschriebenen Arbeitsweise nach chromatographischer Reinigung und Kristallisation aus Petroleumbenzin (Sdp. 50-70°C) 0,6 g der Titelverbindung vom Schmp. 150°C.

7. 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(2-[4-(2-methoxyphenyl)]-piperazinyl-1]-ethyl)-amid

a) 4,66 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure werden in 50 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran mit 5,9 g Dicyclohexylcarbodiimid 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Nach Zugabe von 6,71 g 1-(2-Aminoethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-piperazin, gelöst in 30 ml Tetrahydrofuran, wird das Reaktionsgemisch noch 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt und dann 1 Stunde am Rückfluß zum Sieden erhitzt. Man läßt abkühlen, dampft die Reaktionslösung im Vakuum ein und nimmt den Rückstand in 2 n Salzsäure auf. Der zurückbleibende Dicyclohexylharnstoff wird abfiltriert und das Filtrat wird 3 mal mit je 100 ml Chloroform extrahiert. Die wäßrige Phase wird abgetrennt, mit Kaliumcarbonat auf pH 8-9 eingestellt und die sich abscheidende Phase mit Chloroform extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden über Kaliumcarbonat sicc. getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wird an neutralem Kieselgel mit Chloroform/Methanol 9:1 chromatographiert. Nach Eindampfen der Fraktionen wird das ölige Amid in wenig Aceton aufgenommen, mit 20 ml methanolischer Salzsäure versetzt und im Vakuum vom Lösungsmittel befreit. Nach Trocknung über Kaliumhydroxid bei 90°C im Vakuum erhält man 11,2 g (83 %) der Titelverbindung als Trihydrochlorid vom Schmp. 210°C.

b) 5,0 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 12,2 g 1-(2-Aminoethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-piperazin werden bei 140°C 2 Stunden gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch in Aceton gelöst, mit überschüssiger methanolischer Salzsäure versetzt und eingedampft. Das zurückbleibende Salz wird mehrmals mit Aceton ausgekocht, in Wasser gelöst und 3 mal mit je 30 ml Dichlormethan extrahiert. Die wäßrige Phase wird mit 2 n Natronlauge auf pH 9-10 gebracht und mit Dichlormethan erschöpfend extrahiert. Nach dem Abziehen des Lösungsmittels wird der ölige Rückstand im Kugelrohr bei 260°C/0,15 mmHg (20 Pa) destilliert. Man erhält 6,2 g (85 %) der Titelverbindung als nahezu farbloses Öl.

8. 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-amid

5,0 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure werden unter Außenkühlung mit 20 ml Thionylchlorid übergossen und über Nacht stehengelassen. Das Reaktionsgemisch wird im Vakuum eingedampft, der dunkle Rückstand

in Chloroform aufgenommen und zu einer Lösung von 6,7 g 3-Diethylaminopropylamin in 20 ml Chloroform getropft. Die Mischung wird 3 Stunden bei 40°C gerührt und nach dem Abkühlen mit 2 n Natronlauge extrahiert. Die Chloroformphase wird über Kaliumcarbonat
5 getrocknet und eingedampft. Man destilliert den öligen Rückstand im Kugelrohr bei 170°C/0,01 mmHg (1,33 Pa) und erhält 4,2 g (56 %) der Titelverbindung als gelbliches Öl.

9. 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(2-dimethylaminoethyl)-amid

10 5,4 g 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure werden mit 3 g Triethylamin in 60 ml Dichlormethan gelöst. Dazu tropft man unter Eiskühlung 3,3 g Chlorkohlensäureethylester, rührt 15 Minuten bei Raumtemperatur und fügt dem Gemisch 3,4 g 2-Dimethylaminoethylamin zu und rührt
15 weitere 30 Minuten bei Raumtemperatur. Anschließend wird die Dichlormethanlösung mit 2 n Salzsäure ausgeschüttelt; die salzsaure Phase wird mit 2 n Natronlauge alkalisiert und erneut mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden mit Wasser extrahiert, über Kaliumcarbonat getrocknet und eingeeengt. Nach Destillation im Kugelrohr bei 150°C/0,01 mmHg (1,33 Pa) er-
20 hält man 4,9 g (66 %) der Titelverbindung als leicht gelbliches Öl.

10. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid

5,0 g 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 10 g 1-(3-Aminopropyl)-4-(2-methoxyphenyl)-piperazin werden bei 140°C 1,5 Stunden
25 gerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch in wenig Chloroform aufgenommen und durch Chromatographie an neutralem Kieselgel mit Chloroform/Methanol 95:5 gereinigt. Nach dem Eindampfen der entsprechenden Fraktionen wird der Rückstand aus Petroleumbenzin
30 (Sdp. 50-70°C)/Ethylacetat 9:1 kristallisiert. Man erhält 3 g (30 %) der Titelverbindung vom Schmp. 132-134°C.

11. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)-amid

5,0 g 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester werden in 20 ml 3-Dimethylaminopropylamin 3 Stunden bei 70°C gerührt. Man zieht im Vakuum
35 alle flüchtigen Anteile ab, nimmt den Rückstand in Chloroform auf und chromatographiert an neutralem Kieselgel mit Chloroform/Methanol

9 : 1. Die entsprechenden Fraktionen werden gesammelt, eingengt und im Kugelrohr bei 210°C/0,1 mmHg (13,3 Pa) destilliert. Man erhält 3,8 g (57 %) der Titelverbindung als gelbliches Öl.

- 5 Nach der in Beispiel 11 beschriebenen Arbeitsweise werden aus entsprechend substituierten Pyridin-2-carbonsäuremethylestern und Aminen die folgenden Pyridin-2-carbonsäureamide erhalten:

12. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(2-piperidinoethyl)-amid

- 10 Aus 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 2-Piperidinoethylamin. Schmp. 72-76°C; Ausbeute 44 %.

13. 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(2-diethylaminoethyl)-amid

- 15 Aus 5-Phenylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 2-Diethylaminoethylamin. Sdp. (Kugelrohr) 190°C/0,1 mmHg (13,3 Pa); Schmp. 47-53°C; Ausbeute 20 %.

14. 5-(3,4-Dichlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(2-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-ethyl)-amid

- 20 Aus 5-(3,4-Dichlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 2-[4-(2-Methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-ethylamin. Schmp. 104°C; Ausbeute 40 %.

15. 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid

- 25 Aus 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-[4-(2-Methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propylamin. Schmp. 143°C; Ausbeute 83 %.

30 16. 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-amid

- Aus 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-Diethylaminopropylamin. Schmp. 79°C (x 1,5 HCl); Ausbeute 15 %.

35 17. 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid

- Aus 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-[4-(2-Methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propylamin. Schmp. 186°C (x HCl); Aus-

beute 82 %.

18. 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-piperidinopropyl)-amid

- 5 Aus 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-Piperidinopropylamin. Schmp. 89°C; Ausbeute 77 %.

19. 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-ethoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid

- 10 Aus 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-[4-(2-Ethoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propylamin. Schmp. 80°C (x HCl x H₂O); Ausbeute 58 %.

20. 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)-

15 amid

Aus 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-Dimethylaminopropylamin. Leicht gelbliches Öl; Ausbeute 62 %.

21. 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-piperidinopropyl)-

20 amid

Aus 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-Piperidinopropylamin. Schmp. 77°C; Ausbeute 64 %.

22. 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid.

25

Aus 6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-[4-(2-Methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propylamin. Schmp. 143°C; Ausbeute 59 %.

23. 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)-amid

30

Aus 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-Dimethylaminopropylamin. Schmp. 111°C; Ausbeute 72 %.

24. 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-pyrrolidinopropyl)-amid

35

Aus 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-Pyrrolidinopropylamin. Leicht gelbliches Öl; Ausbeute 61 %

25. 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-pyrrolidinopropyl)-amid

Aus 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-pyridin-2-carbonsäuremethylester und 3-pyrrolidinopropylamin. Schmp. 102-104°C; Ausbeute 67 %.

5

Gewerbliche Anwendbarkeit

Die erfindungsgemäßen substituierten Picolinsäuren der allgemeinen Formel I besitzen wertvolle Eigenschaften, die sie gewerblich verwertbar machen; insbesondere senken sie anhaltend den Blutdruck, wie aus Untersuchungen an wachen, genetisch hypertonen Ratten hervorgeht, wobei sie sich bekannten Picolinsäurederivaten, wie z.B. 5-Butyl-2-pyridin-carbonsäure (INN: Fusarsäure) oder 5-Butyl-2-pyridincarbonsäureamid (INN: Bupicomid) überlegen erweisen. Außerdem hemmen die Substanzen die elektrisch induzierte Tachykardie und weisen darüberhinaus eine interessante α_1 -adrenolytische Wirkung auf.

Die ausgezeichnete Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel I gestattet ihren Einsatz in der Humanmedizin, wobei als Indikationen insbesondere primäre (essentielle) und sekundäre Hypertonien aller Schweregrade in Betracht kommen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Behandlung von Säugetieren, die an einer der obengenannten Krankheiten erkrankt sind. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man dem erkrankten Säugetier eine therapeutisch wirksame und pharmakologisch verträgliche Menge einer oder mehrerer Verbindungen der allgemeinen Formel I verabreicht.

Gegenstand der Erfindung sind außerdem die Verbindungen der Formel I zur Anwendung bei der Behandlung der Hypertonie.

35

Ebenso umfaßt die Erfindung die Verwendung von Verbindungen der Formel I bei der Herstellung von Arzneimitteln, die zur Bekämpfung der Hypertonie eingesetzt werden.

- 5 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Arzneimittel, die eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel I enthalten.

Die Arzneimittel werden nach an sich bekannten, dem Fachmann geläufigen Verfahren hergestellt. Als Arzneimittel werden die erfindungsgemäßen
10 pharmakologisch wirksamen Verbindungen (=Wirkstoffe) entweder als solche, oder vorzugsweise in Kombination mit geeigneten pharmazeutischen Hilfsstoffen in Form von Tabletten, Dragées, Kapseln, Suppositorien, Emulsionen, Suspensionen oder Lösungen eingesetzt.

- 15 Welche Hilfsstoffe für die gewünschten Arzneimittelformulierungen geeignet sind, ist dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens geläufig. Neben Lösungsmitteln, Gelbildnern, Salbengrundlagen, Suppositoriengrundlagen, Tabletten-Hilfsstoffen und anderen Wirkstoffträgern können beispielsweise Antioxidantien, Dispergiermittel, Emulgatoren, Entschäumer, Geschmackskorrigentien,
20 Konservierungsmittel, Lösungsvermittler oder Farbstoffe verwendet werden.

Die Wirkstoffe können oral oder parenteral appliziert werden, wobei die orale und die intravenöse Applikation bevorzugt ist.

- 25 Im allgemeinen hat es sich in der Humanmedizin als vorteilhaft erwiesen, den oder die Wirkstoffe bei oraler Gabe in einer Tagesdosis von etwa 0,01 bis etwa 50, vorzugsweise 0,1 bis 20, insbesondere 0,5 bis 10 mg/kg Körpergewicht, gegebenenfalls in Form mehrerer, vorzugsweise 1 bis 4 Einzelangaben zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses zu verabreichen.
30 Bei einer parenteralen, z.B. intravenösen Behandlung können ähnliche Dosierungen zur Anwendung kommen. Bei einschleichender Dosierung wird zu Beginn der Behandlung eine geringere Dosis verabreicht, dann langsam auf eine höhere Dosis übergegangen. Nach Erreichen der gewünschten Blutdrucksenkung wird wieder auf eine niedrigere Dosis zurückgegangen.

Die Festlegung der jeweils erforderlichen optimalen Dosierung und Applikationsart der Wirkstoffe kann durch jeden Fachmann aufgrund seines Fachwissens leicht erfolgen.

- 5 Sollen die erfindungsgemäßen substituierten Picolinsäuren und/oder ihre Säureadditionssalze zur Behandlung der Hypertonie eingesetzt werden, so können die pharmazeutischen Zubereitungen auch einen oder mehrere andere pharmakologisch aktive Bestandteile anderer Arzneimittelgruppen, wie andere Antihypertensiva, β -Rezeptorenblocker, Diuretika, Saluretika,
- 10 Alkaloide, etc., wie Dihydralazin, Propranolol, Labetalol, Mefrusid, Clopamid, Spironolacton, Chlorthalidon, Furosemid, Polythiazid, Hydrochlorothiazid, Reserpin, Dihydroergocristin, Rescinnamin, Rauwolfia-Gesamtalkaloide etc. enthalten.
- 15 Die Formulierung der Wirkstoffe kann z.B. auf folgende Weise erfolgen:
- a) Tabletten mit einem Wirkstoffgehalt von 20 mg
10,81 kg 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)-amid-hydrochlorid, 50,0 g Calciumsulfatdihydrat, 31,0 kg Maisstärke und 3,0 kg Polyvinylpyrrolidon werden mit 20 l Wasser be-
- 20 feuchtet und durch ein Sieb mit 1,25 mm Maschenweite granuliert. Das Granulat wird im Wirbelschichttrockner bis zu einer relativen Feuchte von 50-60 % getrocknet und dann mit 8,0 g Natriumcarboxymethylcellulose, 2,0 kg Talkum und 1,0 kg Magnesiumstearat versetzt. Das fertige Granulat wird zu Tabletten à 200 mg und 8 mm Durchmesser verpreßt.
- 25 b) Ampullen mit einem Wirkstoffgehalt von 22,5 mg
1,502 kg 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-amid-fumarat werden in 80 Liter aqua bidestillata gelöst und mit 4,337 kg Mannit versetzt. Die Lösung wird mit aqua bidestillata auf 100 kg auf-
- 30 gefüllt, über einen Filter sterilfiltriert und in 2-ml-Ampullen abgefüllt.
- c) 25000 Retard-Kapseln mit einem Wirkstoffgehalt von 30 mg
8,9 kg 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperaziny1-1]-propyl)-amid-hydrochlorid und 3,1 kg Hydroxypropylmethyl-
- 35 cellulose werden in einem Gemisch von 16 l 96 %igem Ethanol und 24 l

Wasser gelöst. In diese Lösung wird 1,1 kg Talkum suspendiert. In einem Wirbelschichtgerät werden 16 kg Zuckerpellets mit dieser Wirkstofflösung besprüht. Die erhaltenen Wirkstoffpellets werden im gleichen Gerät mit einer Lösung aus 0,6 kg Ethylcellulose, 0,3 kg 5 Hydroxypropylmethylcellulose und 0,12 kg Stearinsäure in 14,8 l Methylencchlorid und 4,0 l 96 %igem Ethanol besprüht. Nach dem Trocknen der überzogenen Wirkstoffpellets werden diese in Hartgelatinekapselfn der Größe 4 abgefüllt.

10

15

20

25

30

35

Pharmakologie

Zur Bestimmung der antihypertensiven Wirkung werden die unten aufgeführten Verbindungen in den angegebenen Dosen an vier aufeinander folgenden Tagen an je 6 Ratten (Stamm SHR/N/Ibm/B^m, ♂, 250-350 g) mit genetisch bedingtem
5 Hochdruck (RR > 180 mmHg) täglich einmal mittels Schlundsonde verabfolgt. Die Messung des Blutdrucks erfolgt jeweils 2, 6 und gegebenenfalls 24 Stunden nach Substanzgabe.

Die Blutdruckmessung wird in einer Wärmekammer bei 36°C vorgenommen, um
10 eine bessere Durchblutung der Schwanzarterie zu erreichen. Hierzu werden die Tiere in perforierte Lochblechkäfige verbracht und 20 - 40 Min. nach Beginn der Aufwärmung gemessen. Zur Messung des systolischen arteriellen Drucks wird eine ringförmige Manschette mit aufblasbarer Gummimembran zur Unterbindung der Durchblutung und ein ringförmiger Piezokristallaufnehmer
15 zur Erfassung der Pulswellen auf den Schwanz aufgeschoben. Nach erfolgter Unterbindung des Blutstroms in der Schwanzarterie wird der Manschetten-
druck kontinuierlich reduziert. Die Wiederkehr der Pulswellen bei Druck-
ablassen wird automatisch als systolischer Blutdruck erkannt und ausge-
druckt (Bühler, R. et al.: Microprocessor-based automation of blood
20 pressure measurement in the conscious rat. Proceedings of the 4th inter-
national symposium on rats with spontaneous hypertension and related
studies, Rascher, R. et al. (Eds.), Schattauer Verlag, Stuttgart, New
York, 1982, S.410-413). Pulssignale und Druckverlauf werden zur Auswertung
graphisch aufgezeichnet.

25 Zur Gewöhnung an den Meßvorgang werden die Tiere vor Substanzprüfung
14 Tage trainiert. In der zweiten Trainingswoche werden Blutdruck-Vorwerte
erhoben. Tiergruppen, die Substanz erhalten, werden gegen eine Kontroll-
gruppe geprüft.

30 Zur Prüfung der Hemmung der elektrisch induzierten Tachykardie wird nach
Kobinger und Pichler vorgegangen (Kobinger, W. und Pichler, L.: Investi-
gation into different types of post- and presynaptic α -adrenoceptors at
cardiovascular sites in rats. Eur.J.Pharmacol. 65, 393-402, 1980). Zur
35 Prüfung der α_1 -adrenolytischen Wirkung wird das Modell nach Arunlakshana
und Schild eingesetzt (Arunlakshana, O. und Schild, H.O.: Some quanti-
tative uses of drug antagonists. Brit.J.Pharmacol. 14, 48, 1959).

Die Toxizitätsuntersuchungen werden an weiblichen NMRI-Mäusen (Körpergewicht 22 - 26 g) durchgeführt. Die Tiere (5 Tiere pro Dosis) erhalten Futter und Wasser ad libitum. Verschiedene Dosen der Substanzen werden oral verabreicht. Die Beobachtungsdauer beträgt 14 Tage. Die LD₅₀, d.h. die Dosis bei der 50 % der Tiere sterben, wird aus der Dosiswirkungskurve graphisch ermittelt.

In den anschließenden Tabellen werden die untersuchten Verbindungen durch laufende Nummern gekennzeichnet, die wie folgt zugeordnet sind:

lfd. Nr.	Name der Verbindung
15	1 5-Butyl-2-pyridincarbonsäure (Fusarsäure)
	2 5-Butyl-2-pyridincarbonsäureamid (Bupicomid)
	3 5-n-Butylpyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)-ester
20	4 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-ester
	5 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid
	6 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(3-dimethylaminopropyl)-amid
25	7 5-Phenylpyridin-2-carbonsäure-(2-diethylaminoethyl)-amid
	8 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid
	9 5-(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-carbonsäure-(3-diethylaminopropyl)-amid
30	10 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-methoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid
	11 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-[4-(2-ethoxyphenyl)-piperazinyl-1]-propyl)-amid
35	12 5-Cyclohexylmethylpyridin-2-carbonsäure-(3-piperidino-propyl)-amid

Tabelle I gibt für die Vertreter der erfindungsgemäßen Verbindungen die prozentuale Senkung des Blutdrucks nach oraler Verabreichung bei der Ratte und die letale Wirkung nach oraler Gabe bei der Maus wieder.

5 Tabelle I

%-Änderungen des Blutdrucks (BP) an genetisch hypertonen Ratten nach täglich einmaliger p.o.-Applikation an vier aufeinanderfolgenden Tagen (N=6/Dosis) und Toxizität (p.o.; LD₅₀) an Mäusen (N=5/Dosis).

10	Ifd. Nr.	Dosis		BP (%-Änderungen)								LD ₅₀ p.o. (mg/kg)
				1. Tag			2.Tag		3.Tag		4.Tag	
		(mg/kg)	(μ Mol/kg)	2h	6h	24h	6h	6h	24h	2h	6h	
15	1	6,4	35,7	-4	+3	-1	+3	-6	+5	-1	-3	260
		20,0	111,6	-8	-5		-6	+2		-9	-6	
		25,6	142,8	+15	-3	0	-10	-15	-5	-5	-10	
	2	20,0	112,2	-5	-10		-6	-4		-5	-7	
		20,0	112,2	-8	-13	0	-9	-7	-2	-8	-10	
		18,5	70,0	-10	-9	-2	-16	-19	-1	-13	-15	
20	3	9,25	35,0	-2	-3	-3	-9	-10	-2	-9	-10	
		21,9	70,0	-8	-6	-4	-5	-8	0	-7	-7	
		10,9	35,0	-8	-4	-5	-4	-8	-3	-12	-8	
	5	20,0	46,5	-3	-2	-6	-8	-14	-5	-6	-9	
		10,0	23,2	-4	-10	-6	-10	-13	-12	-13	-12	
		6,4	22,6	-7	-7	-2	-8	-8	-6	-8	-9	
	6	25,6	90,3	+1	-7	+4	-8	-7	-4	-7	-10	
		20,8	70,0	-5	-9	-7	-7	-10	-6	-6	-7	
		10,4	35,0	-7	-6	-4	-8	-9	-4	-4	-4	
30	7	6,4	13,8	-5	-9	-5	-10	-7	-10	-10		
		11,6	25,0	-7	+1	-6	-15	-19	-23	-14	-20	
		25,6	55,1	-6	-9	-8	-9	-9	-10	-6		
	8	46,5	100,0	-7	+9	-11	-21	-27	-21	-22	-13	>>1000

Fortsetzung Tabelle I:

Ifd. Nr.	Dosis		BP (% Änderungen)								LD ₅₀ (p.c.) mg/kg
	(mg/kg)	(μ Mol/kg)	2h	1. Tag 6h	24h	2. Tag 6h	3. Tag 6h	24h	4. Tag 2h	6h	
5	9	6,4	-6	-4	-6	-19	-5	-1	-9	-14	> 1000
		25,6	-19	-11	-22	-20	-21	-15	-19	-25	
	10	6,4	-19	-14	-20	-12	-11	-5	-16	-24	>> 1000
		25,6	-26	-20	-14	-12	-12	-3	-12	-22	
10	11	6,4	+2	-1	+10	-14	-10	+4		-10	
		25,6	-7	-9	+4	+3	-15	-10			
	12	6,4	-14	-7	-1	-1	-6	-1	-16	-10	
		25,6	-10	-12	-10	-2	-11	-6	-11	-10	

- 15 Die folgende Tabelle II gibt die Therapeutische Wirksamkeit (Th.W.) der in Tabelle I aufgeführten Verbindungen wieder. Die Therapeutische Wirksamkeit ist der Quotient aus maximaler prozentualer Änderung des Blutdrucks BP und der applizierten Dosis (μ Mol/kg), wobei jeweils der Mittelwert dieses Quotienten für die in Tabelle I angegebenen Dosierungen angegeben wird.

20

Tabelle II

Therapeutische Wirksamkeit (Th.W.) errechnet aus der maximalen prozentualen Änderung des Blutdrucks (BP) und der applizierten Dosis.

Ifd. Nr.	Th.W. $\left[\frac{\% \text{-Änderung BP}}{\mu\text{mol/kg}} \times 100 \right]$							
	2h	1. Tag 6h	24h	2. Tag 6h	3. Tag 6h	24 h	4. Tag 2h	6h
30	1	-2,6	0,6	-1,4	-1,3	-8,5	5,2	-4,8
	2	-5,6	-10,3	1,3	-6,7	-4,5	0,4	-5,6
	3	-10,0	-10,7	-5,7	-24,3	-27,9	-3,6	-22,1
	4	-17,1	-10,0	-10,0	-9,3	-17,1	-4,3	-22,1
	5	-11,8	-23,7	-19,4	-30,2	-43,1	-31,2	-34,5
	6	-14,9	-19,4	-2,2	-22,1	-21,6	-15,5	-21,6
35	7	-13,6	-15,0	-10,7	-16,4	-20,0	-7,8	-10,7

Fortsetzung Tabelle II:

lfd. Nr.	Th.W. $\left[\frac{\% \text{-Änderung BP}}{\mu\text{mol/kg}} \times 100 \right]$								
	2h	1. Tag 6h	24h	2. Tag 6h	3. Tag 6h	24 h	4. Tag 2h	6h	
5	8	-20,5	-17,1	-21,4	-42,4	-42,5	-50,9	-40,3	-46,5
	9	-29,1	-18,3	-31,1	-64,9	-27,7	-12,9	-37,2	-54,8
	10	-89,8	-66,9	-82,7	-52,8	-49,3	-20,3	-66,9	-103,9
	11	0,9	-11,8	39,9	-48,0	-49,9	23,6	--	-36,2
10	12	-44,4	-26,9	-9,4	-4,1	-23,6	-6,8	-50,4	-33,6

In der Tabelle III ist der Therapeutische Index mit der Normierung Th.W. Fusarsäure = 1 für die in Tabelle II angegebenen Tage wieder gegeben. Die 2h-, 6h- und 24 h-Werte des 1., die 6 h- und 24h-Werte des 3. und die 2 h- und 6h - Werte des 4. Tages wurden hierbei gemittelt.

Tabelle III

Therapeutischer Index (Th.I.) mit der Normierung Th.W. Fusarsäure = 1.

20

	lfd. Nr.	Th.I. Fusarsäure = 1			
		1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag
20	1	1	1	1	1
	2	4,3	5,2	2,5	1,1
	3	7,8	18,7	9,5	4,1
	4	10,9	7,2	6,5	3,3
	5	16,2	23,2	22,5	6,0
30	6	10,8	17,0	11,2	4,1
	7	11,6	12,6	8,4	1,8
	8	17,4	32,6	28,3	7,5
	9	23,1	49,9	12,3	7,9
	10	70,6	40,6	21,1	14,7
35	11	-25,7	36,9	8,0	5,2
	12	23,8	3,2	9,2	7,2

P a t e n t a n s p r ü c h e


(für alle benannten Vertragsstaaten außer Österreich)

1. Verbindungen der allgemeinen Formel I

5

10

15



(I),

worin

- R^1 Alkyl mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen - jedoch nicht Butyl, wenn R^2 und R^3 die Bedeutung Alkyl haben und X NH bedeutet -, Cycloalkylalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- R^2 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- R^3 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, oder
- R^2 und R^3 gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Morpholino, Piperidino, Hexahydroazepino oder in 4-Position durch R^4 substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,
- R^4 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Benzyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen

und


X O (Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen, wobei R^1 , R^2 und R^3 nicht gleichzeitig Alkyl bedeuten, wenn X O(Sauerstoff) und A Ethylen darstellt.

5

2. Verbindungen der allgemeinen Formel I*

10



(I*),

15

worin

R^{1*} Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen (jedoch nicht Butyl, wenn R^{2*} und R^{3*} die Bedeutung Methyl oder Ethyl haben und X NH darstellt) bedeutet,

20

R^{2*} Methyl oder Ethyl bedeutet,

R^{3*} Methyl oder Ethyl bedeutet oder

R^{2*} und R^{3*} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4*} substituiertes 1-Piperazinyll bedeuten,

25

R^{4*} Phenyl oder durch Methoxy oder Ethoxy substituiertes Phenyl bedeutet,

A* Ethylen oder Trimethylen und


X* O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen, wobei R^{2*} und R^{3*} nicht Methyl oder Ethyl bedeuten, wenn X* O(Sauerstoff) und A* Ethylen darstellt.

30

35

3. Verbindungen der allgemeinen Formel I**



worin

15 R^{1**} Cycloalkylalkyl mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 oder 2 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu zwei Substituenten aus der Gruppe Chlor, Methoxy oder Ethoxy bedeutet,

R^{2**} Methyl oder Ethyl bedeutet,


R^{3**} Methyl oder Ethyl bedeutet,

20 A^{**} Ethylen oder Trimethylen und

X^{**} O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

4. Verbindungen der allgemeinen Formel I***



35

worin

R^{1***} Cycloalkylalkyl mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 oder 2 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu zwei Substituenten aus der Gruppe Chlor, Methoxy oder Ethoxy bedeutet,

5 R^{2***} und R^{3***} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4***} substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,

10 R^{4***} Wasserstoff, Methyl, Phenyl oder durch Methoxy oder Ethoxy substituiertes Phenyl bedeutet,


A^{***} Ethylen oder Trimethylen und

X^{***} O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie die Säureadditionssalze dieser Verbindungen.

- 15 5. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Picolinsäurederivate der allgemeinen Formel II

20



mit Aminen der allgemeinen Formel III

25



30 umgesetzt und gewünschtenfalls anschließend in die Säureadditionssalze überführt, wobei die Reste Y und Z so zu wählen sind, daß das Glied X gebildet wird, und wobei R^1 , R^2 , R^3 , A und X die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben.

35

6. Verbindungen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2, 3 oder 4 zur Anwendung bei der Behandlung des Bluthochdrucks.

5 7. Arzneimittel enthaltend eine oder mehrere Verbindungen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2, 3 oder 4 und/oder ihre pharmakologisch verträglichen Säureadditionssalze.

10

15

20

25

30

35

P a t e n t a n s p r ü c h e


(für Österreich)

1. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I

5

10


15



worin

- R^1 Alkyl mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen - jedoch nicht Butyl, wenn R^2 und R^3 die Bedeutung Alkyl haben und X NH bedeutet -, Cycloalkylalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- R^2 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- R^3 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Alkenyl mit 3 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeutet, oder
- R^2 und R^3 gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Morpholino, Piperidino, Hexahydroazepino oder in 4-Position durch R^4 substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,
- R^4 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Benzyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu drei Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet,
- A geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen und

X O (Sauerstoff) oder NH bedeutet,
sowie den Säureadditionssalzen dieser Verbindungen, wobei R^1 , R^2 und R^3
nicht gleichzeitig Alkyl bedeuten, wenn X O (Sauerstoff) und A Ethylen
darstellt, dadurch gekennzeichnet, daß man Picolinsäurederivate der
5 allgemeinen Formel II




mit Aminen der allgemeinen Formel III



umsetzt und gewünschtenfalls anschließend in die Säureadditionssalze
überführt, wobei die Reste Y und Z so zu wählen sind, daß das Glied X
gebildet wird, und wobei R^1 , R^2 , R^3 , A und X die vorstehend angegebenen
20 Bedeutungen haben.

2. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I*



worin
 R^{1*} Alkyl mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen (jedoch nicht Butyl, wenn R^{2*}
und R^{3*} die Bedeutung Methyl oder Ethyl haben und X NH darstellt)
35 bedeutet,

R^{2*} Methyl oder Ethyl bedeutet,

R^{3*} Methyl oder Ethyl bedeutet oder


R^{2*} und R^{3*} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4*} substituiertes 1-Piperazinyll bedeuten,

R^{4*} Phenyl oder durch Methoxy oder Ethoxy substituiertes Phenyl bedeutet,


A^* Ethylen oder Trimethylen und

X^* O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie den Säureadditionssalzen dieser Verbindungen, wobei R^{2*} und R^{3*} nicht Methyl oder Ethyl bedeuten, wenn X^* O(Sauerstoff) und A^* Ethylen darstellt, dadurch gekennzeichnet, daß man Picolinsäurederivate der allgemeinen Formel II*




mit Aminen der allgemeinen Formel III*



umsetzt und gewünschtenfalls anschließend in die Säureadditionssalze überführt, wobei die Reste Y^* und Z^* so zu wählen sind, daß das Glied X^* gebildet wird, wobei R^{1*} , R^{2*} , R^{3*} , A^* und X^* die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben.

3. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I**



worin

R^{1**} Cycloalkylalkyl mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 oder 2 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu zwei Substituenten aus der Gruppe Chlor, Methoxy oder Ethoxy bedeutet,


R^{2**} Methyl oder Ethyl bedeutet,

R^{3**} Methyl oder Ethyl bedeutet,


A^{**} Ethylen oder Trimethylen und

X^{**} O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

sowie den Säureadditionssalzen dieser Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man Picolinsäurederivate der allgemeinen Formel II**




mit Aminen der allgemeinen Formel III**



umsetzt und gewünschtenfalls anschließend in die Säureadditionssalze überführt, wobei die Reste Y^{**} und Z^{**} so zu wählen sind, daß das Glied X^{**} gebildet wird, und wobei R^{1**} , R^{2**} , R^{3**} , A^{**} und X^{**} die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben.

4. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I***



Worin

15 R^{1***} Cycloalkylalkyl mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen im Cycloalkyl- und 1 oder 2 Kohlenstoffatomen im Alkylenteil, Phenyl oder substituiertes Phenyl mit bis zu zwei Substituenten aus der Gruppe Chlor, Methoxy oder Ethoxy bedeutet,


20 R^{2***} und R^{3***} gemeinsam und unter Einschluß des Stickstoffatoms, an das sie gebunden sind, Pyrrolidino, Piperidino oder in 4-Position durch R^{4***} substituiertes 1-Piperazinyl bedeuten,

R^{4***} Wasserstoff, Methyl, Phenyl oder durch Methoxy oder Ethoxy substituiertes Phenyl bedeutet,


A^{***} Ethylen oder Trimethylen und

X^{***} O(Sauerstoff) oder NH bedeutet,

25 sowie den Säureadditionssalzen dieser Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man Picolinsäurederivate der allgemeinen Formel II***



mit Aminen der allgemeinen Formel III***



5 umsetzt und gewünschtenfalls anschließend in die Säureadditionssalze
überführt, wobei die Reste Y*** und Z*** so zu wählen sind, daß das
Glie d X*** gebildet wird, und wobei R^{1***}, R^{2***}, R^{3***}, A*** und
X*** die vorstehend angegebenen Bedeutungen haben.

10

15

20

25

30

35

0123700



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 83 10 4094

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³)
Y	IL FARMACO, Editione Scientif., Band 36, Nr. 4, 1981, Seiten 260-68, Milano (IT); C.RUNTI et al.: "Fusaric acid derivatives and analogues as possible antihypertensive drugs". *Seite 263, Tabelle 1; Seite 266*	1,5-7	C 07 D 213/79 C 07 D 213/81 A 61 K 31/44
Y	--- CHEMICAL ABSTRACTS, Band 90, Nr. 1, 1. Januar 1979, Seite 567, Nr. 6197z, Columbus Ohio (USA); T.M.MEDVEDEVA et al.: "Synthesis and pharmacological activity of fusaric acid and its derivatives". & KHIM. FARM. ZH. 1978, 12(5), 66-9.	1,5-7	
Y,D	--- SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED, Section Chemical, Derwent Publications Ltd., Woche B06, 21. März 1979, Seite 74; & SU - A - 598 892 (AS USSR BIOCH PHYSI) (17.03.78) *Zusammenfassung*	1,5-7	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³) C 07 D 213/00 A 61 K 31/00
Y	--- US-A-4 009 174 (R.CLUZAN) *Insgesamt*	1,5-7	
E	--- DE-A-3 239 573 (BYK GULDEN LOMBERG) *Insgesamt*	1-7	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 06-12-1983	Prüfer NUYTS A.M.K.A.
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			